



LE ZECCHE, QUANDO INFETTE, POSSONO ESSERE PERICOLOSI VETTORI DI MALATTIE PER L'UOMO

E PER GLI ANIMALI

LUOGHI A RISCHIO:

Boschi e sottoboschi

Parchi e giardini

Campi e prati incolti

Luoghi abitati da animali selvatici

cosa fare per prevenire la puntura di zecca?

Usare un ABBIGLIAMENTO adeguato durante le escursioni:

- Scarpe chiuse
  - Colori chiari
  - •Pantaloni lunghi infilati negli stivali o nelle calze
  - •Camicie manica lunga
  - •Indumenti stretti attorno a polso e caviglie

Usare repellenti sugli abiti e sulle parti scoperte del corpo.

Dopo escursioni, ispezionare attentamente tutto il corpo per verificare la presenza di zecche.

# come intervenire in caso di puntura di zecca?

## **DA FARE**

Estrarre la zecca il più presto possibile:

•afferrando il rostro della zecca con una pinza il più possibile vicino alla cute, evitando di danneggiarla

•tirando leggermente e imprimendo un movimento rotatorio.

### Dopo aver estratto la zecca:

- •DISINFETTARE la zona interessata, utilizzando un disinfettante non colorato
- •TENERE SOTTO CONTROLLO la zona del corpo da cui è stata estratta la zecca PER 30-40 GIORNI: SE COMPARE GONFIORE, ROSSORE O ALTRI SINTOMI RIVOLGERSI AL MEDICO
- •CONSERVARE la zecca in un barattolo ben sigillato (viva oppure in alcol al 70% oppure congelata) e INVIARE, per la ricerca di eventuali patogeni e l'identificazione di specie, a: Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta Via Bologna, 148 - 10154 Torino LAB. NEUROPATOLOGIA -

LAB. DIAGNOSTICA MOLECOLARE VIROLOGICA Tel. 011 2686261 Fax. 0112686360

E-mail: cea@izsto.it

Website: http//www.izsto.it

## DA NON FARE

NON usare sostanze oleose, acetone o alcol per non aumentare il rischio di infezioni,

NON bruciare,

NON spremere,

NON buttare la zecca.

#### **CON IL PATROCINIO DI:**





Testo:

Alessandra Pautasso, Maria Domenica Pintore, Cristina Casalone

Realizzazione grafica:

Alessandra Pautasso, Antonio Longo

Disegni:

Giorgia Juvenal